

Hoitomuotojen tehokkuus ja riskit




Head ym. 2015: 35 tutkimusta (7 RCT, 6 kohortti, 22 tapaussarjaa), 2 239 potilasta

Horvath ym. 2022: 11 tutkimusta (5 RCT, 6 havainnoivaa), 549 potilasta

● Avoleikkaus ● Tähystysleikkaus ● Punktio

VAIN RCT-TUTKIMUKSET

KAIKKI TUTKIMUKSET



Head L, et al. J Hand Surg Am. 2015;40(3):546–553.
Horvath A, et al. J Wrist Surg. 2023;12(2):177–190.

Ranneganglio


Lasse Linnanmäki

Tays käsikirurgia

24.5.2026 · Versio 1.0

Esiintyvyys oireettomilla 51 %

103 oireetonta vapaaehtoista · Keski-ikä 36 v (19–67) · Prospektiivinen poikkileikkaustutkimus




Lowden CM, et al. J Hand Surg Eur Vol. 2005;30(3):302–306.

Luonnollinen kulku

236 potilasta · Keski-ikä 36 v · Seuranta keskimäärin 6 vuotta (70 kk) · Prospektiivinen kohorttitutkimus

● Avoleikkaus ● Punktio ● Seuranta
KIPUA KOKEVIEN OSUUS



	Tyytyväisyys	Uusiutuminen	Poissaolo toistää	Komplikaatiot
Avoleikkaus	83 %	39 %	~11 pv	8 % Puutuminen, arven arkuus
Punktio	81 %	58 %	~3 pv	3 % Arven arkuus
Seuranta	53 %	58 %	~2 pv	0 %

Dias JJ, et al. J Hand Surg Eur Vol. 2007;32(5):502–508.